

■ Všeobecné pokyny pro nemocné s pohlavními chorobami

- Veškerý personál venerologických pracovišť je speciálně školený v zachování **povinné mlčenlivosti**.
- Informujte svého partnera o svém onemocnění.
- Přiveďte na vyšetření své partnery, nebo ohrožené osoby, kontakty a pomozte je vyhledat za pomoci naší depistážní služby.
- Během návštěvy na naší ambulanci se Vám bude věnovat **depistážní sestra**, která je součástí státního dozoru nad pohlavními chorobami a podílí se na ochraně veřejného zdraví. Její náplň práce spočívá ve shromažďování informací o nemocném, tzv. "Hlášení pohlavních nemocí" = depistáž. Současně asistuje u vyšetřovacích metod a zajišťuje Vaši dispenzarizaci.
- Vaše zdravotní dokumentace je uložena v uzamčené kartotéce a nikdo nepovoláný k ní nemá přístup.
- Vaši diagnózu nesmíme sdělit na Vaše pracoviště.
- Diagnóza se neuvádí ani na potvrzení o pracovní neschopnosti.
- Depistážní sestře a lékaři je třeba uvést všechny osoby, se kterými jste měl pohlavní, či jiný intimní styk.
- Je třeba si pamatovat, že prodělané onemocnění syfilis **Vám neposkytuje ochranu před novou nákazou!**
- Během léčení a v průběhu kontrol platí **zákaz pohlavního styku** po dobu, kterou určí ošetřující lékař.
- **Termíny kontrolních vyšetření určuje lékař a pacient je musí dodržovat!**
- Dodržujte pravidla **bezpečného sexu**, mějte stálého partnera, používejte kondom, který Vás může ochránit před nákazou a ženy před nechtěným těhotenstvím.
- Pokud Vaše onemocnění vyžaduje hospitalizaci na lůžkovém oddělení, budete uloženi na izolační pokoj (přijímající lékař indikuje pacienta podle epidemiologického hlediska).
- **Léčba pohlavních chorob je ze zákona povinná.** U žen, které prodělaly syfilis a jsou těhotné, je nutná zajišťovací léčba, aby se zabránilo narození poškozeného dítěte. Tato léčba je nutná při každém těhotenství.
- **Účinnou léčbu Vám zajistí pouze odborný lékař. Samoléčitelství** vede k poddávkování léku, nemoc přechází z akutního stadia do chronického. Sami se nevyлéčíte a nezabráňte opakované nákaze od nevyšetřeného a neléčeného partnera.
- Své dotazy můžete směřovat buď na ošetřujícího lékaře nebo na depistážní sestru či všeobecnou sestru, která Vám poskytuje ošetřovatelskou péči.

Vyšetření v poradně pro pohlavní choroby je možné každý den ve stanovených hodinách (i bez doporučení odborným lékařem a bez objednání).

Zpracovala:

Bc. Elena Macháčková, vrchní sestra

Odborný poradce:

doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Použité bibliografické a elektronické zdroje:

1. Macháčková, E. Současný trend ve výskytu sexuální přenosných nemocí a specifika ošetrovatelské péče u venerologických pacientů, Olomouc, 2012, Bakalářská práce, Universita Palackého v Olomouci. Fakulta zdravotnických věd. Vedoucí práce H. Pokorná
2. Resl, V. Křemenová, S. Pokyny pro nemocné přijíci, vyd. Národní centrum pro podporu zdraví, Praha 1995, 1. vyd. Epava Olomouc
3. Resl, V. Křemenová, S. Pokyny pro nemocné kapavkou, vyd. Národní centrum pro podporu zdraví, Praha 1995, 1. vyd. Epava Olomouc
4. Záruba, F. Vosmík, F. Záhejský, J. Buchvald, J. Jirásek, L. Dermatovenerologie, vyd. Scietia medica, spol.s.r.o., Praha, s. 215-230, ISBN 80-85526-31-x.
5. <http://www.szv.cz/upload/document/cem/std>
6. <http://www.004.cz/rservice.php?akce=tisk&cislocianku=2005082101>
7. <http://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/lymfogranulomavenerium.htm>
8. <http://www.urology-textbook.com/granuloma-inguinale.html>
9. http://www.hudlegekontoret.org/bildearkiv/kliniske/herpes_simplex/herpes_simplex_genitalis_04
10. <http://www.intechopen.com/books/forensic-medicine-from-old-problems-to-new-challenges/sexual-assault-in-childhood-and-adolescence>
11. <http://21stoleti.cz/blog/2012/06/01/aids-hrozi-nove-varianty-viru/>
12. <http://www.healthhype.com/itchy-rectum-and-anus-causes-and-treatment.html>
13. <http://rompecabezas-medicos.blogspot.cz/2011/03/chancroide.html>
14. Archív Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL

Fm-L009-027-EM-028 (v1)

Kontakt

Fakultní nemocnice Olomouc
Klinika chorob kožních a pohlavních

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: info@fnol.cz

www.fnol.cz

Poradna pro pohlavní choroby

(venerologická poradna, poradna pro STD = Sexually Transmitted Diseases)

Po - Pá 7.00 - 8.00 hod.

tel.: +420 588 444 527,

588 444 526, 588 442 852



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Fakultní nemocnice Olomouc
profesionalita a lidský přístup

Pohlavní choroby stále hrozí

edukační materiál pro pacienty



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Sexuálním stykem se přenáší velké množství infekcí - kvasinky, bakterie, viry, paraziti, prvoci aj. Z virových onemocnění má výjimečné postavení HIV infekce, která je příčinou AIDS. Mezi tzv. přenášené nejčastěji pohlavním stykem patří syfilis, kapavka, měkký vřed, granuloma inguinale a lymfogranuloma venereum, které podléhají povinné léčbě, hlášení a dlouhodobému sledování pacienta.

■ Přehled klasických pohlavních chorob






Infekce šířené téměř **výhradně** pohlavním stykem.







- Příjice (syfilis, lues), původce Treponema pallidum
- Kapavka (gonorrhoea), původce Neisseria gonorrhoeae
- Měkký vřed (ulcus molle), původce Haemophilus ducreyi
- Lymfogranuloma venereum (tzv. čtvrtá pohlavní nemoc), původce Chlamydia trachomatis L1-13
- Granuloma inguinale, původce Calymmatobacterium granulomatosis

■ Další pohlavně přenosné nemoci

Infekce šířené téměř **převážně** pohlavním stykem.

- Chlamydiová infekce, původce Chlamydia trachomatis sérotypy D až K
- Herpes genitalis, původce Herpes simplex virus
- Condylomata accuminata, původce Human papillomavirus (HPV)
- AIDS, původce virus HIV1, 2
- Parazitární infekce – scabies a pediculosis pubis

<p>Syfilis</p>  <p>Tvrdý vřed</p>	<p>Sexuálně přenosná treponematóza, tvoří 3% všech sexuálně přenosných chorob a má vzestupný trend. Inkubační doba je 2 - 4 týdny. Má 3 typická stadia:</p> <p>I. primární – po 3 týdnech nákazy – vzniká nebolestivý tvrdý vřed.</p> <p>II. sekundární – asi 9. týden po infikování – treponemová sepse, dochází k exsudativním projevům na kůži i na sliznicích.</p> <p>Syphilis latens je klinicky nemá fáze tohoto onemocnění a nemá žádné příznaky, pouze pozitivní séroreakce.</p> <p>III. terciární – nastupuje za 5-30 let, kdy vznikají zánětlivé granulomy - gummata. Gummata v kůži, cévách, mozku se provalují a vytéká z nich gumě podobný sekret.</p> <p>Následky: psychické změny, demence.</p>
<p>Vrozená syfilis</p>  <p>Sedlovitý nos</p>	<p>Jedná se o infekci plodu nebo novorozence spirochétou Treponema pallidum získanou od matky intrauterinní (transplacentární), kdy má matka v krevním oběhu treponemy.</p> <p>Plod buď v 5. - 6. měsíci odumře nebo se narodí s příznaky vrozené příjice (krvavé strupy kolem nosu, sedlovitý nos, jizvy kolem úst).</p> <p>Následky: smrt plodu.</p> <p>Následky u pozdní syfilis: syfilitická stigmata (šavlovité tibie, soudkovité zuby, sedlovitý nos, postižené oči, vestibulární hluchota, neurosyfilis, gumata na kostech).</p>
<p>Kapavka</p>  <p>Hnisavý zánět močové trubice</p>	<p>Nejrozšířenější pohlavní nemoc na světě, původce Neisseria gonorrhoeae (bakterie). Onemocnění má obvykle charakter hnisavého zánětu sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů. Inkubační doba 2 - 10 dnů.</p> <p>Následky: Muži - fimóza, parafimóza, prostatitida, sterilita Ženy - sterilita, mimoděložní těhotenství U obou pohlaví – onemocnění pohybového aparátu a endokardu.</p>
<p>Měkký vřed</p> 	<p>Původcem je gramnegativní bakterie Haemophilus ducreyi. Projevuje se často mnohočetnými vřidky v oblasti genitálu.</p> <p>Následky: vředy genitálu hojící se jizvami.</p> <p>Pokročilým stadiem nemoci je bolestivé zduření mizních uzlin – tzv. bubony, jejich prasknutí a vytvoření píštěle, z níž vytéká žlutozelený hnis zbarvený krví.</p>
<p>Lymfo</p> 	<p>Původcem jsou specifické sérotypy bakterie Chlamydia trachomatis. Nemoc postihuje mizní (lymfatické) uzliny (většinou tříselné u mužů a pánevní u žen) a mizní cévy.</p> <p>Následky: Otoky, vředy a píštěle pohlavních orgánů, či zúžení konečníku.</p>

<p>Granuloma inguinale</p> 	<p>Postihuje kůži a podkoží genitálií a přilehlých oblastí, která se vyskytuje především v tropech a subtropích Afriky, jihovýchodní Asie, Karibiku, Austrálie, Indie, Nové Guineje.</p> <p>Následky: Destrukce pohlavních orgánů a třísel.</p>
<p>Chlamydiové infekce</p>  <p>Trachom</p>	<p>Člověk může být nakažen třemi druhy chlamydií. Pouze Chlamydia trachomatis je původcem sexuálně přenosných infekcí a postihuje především močové a pohlavní ústrojí. (Chlamydia psittaci a Chlamydia pneumoniae způsobují u člověka plicní onemocnění.)</p> <p>Následky: Chlamydia trachomatis - trachom – slepota, muži – prostatitida, ženy – mimoděložní těhotenství, obě pohlaví neplodnost.</p>
<p>Herpes genitalis</p> 	<p>Herpes znamená opar, v tomto případě opar na genitáliích.</p> <p>Onemocnění je extrémně bolestivé a často recidivuje.</p> <p>Následky: Herpetický virus se může během porodu přenést na plod a způsobit u něj velmi vážnou celkovou infekci s poškozením nervového systému a s vysokým rizikem celoživotního poškození.</p>
<p>Condylomata</p> 	<p>Condylomata accuminata jsou drobné výrůstky, které se často vyskytují ve skupinách „kvěťkovitého“ tvaru. Postihují kůži a sliznici pohlavního ústrojí, okolí řitního otvoru, ale i sliznice pochvy a děložního čípku.</p> <p>Následky: muži – zúžení předkožky, ženy – nekrotizující cervicitida a cervikální karcinom.</p>
<p>AIDS</p> 	<p>Je virové, přenosné, chronické a progredující onemocnění.</p> <p>V pokročilých stádiích se v důsledku snížení imunity objevují těžké infekce a zhoubné nádory. Prognóza onemocnění je vážná a mortalita (úmrtnost) vysoká.</p> <p>Následky: vyčerpání imunitního systému, malignity, kožní anergie.</p>
<p>Kaposiho sarkom</p> 	<p>Svrab je infekce kůže, vyvolávaná roztočem zákožkou svrabovou. Je to sice nepříjemná, ale léčitelná choroba. Další vyskytující se parazitární infekcí je pediculosis pubis (veš, muška). Žije v ochlupení genitální a řitní oblasti, podpaží, vousů, ale i někdy v obočích. Přenáší se zejména pohlavním stykem, prádlem atd.</p> <p>Následky: svědivá vyrážka, poruchy spánku, chronická únava, alergické reakce.</p>
<p>Pediculosis pubis</p>	