Odběr stolice na vyšetření kalprotektinu, pankreatické elastázy a FOB (kvantitativně)

Odběr se provádí do speciální zkumavky Vitassay s modrobílým víčkem, která obsahuje 2,0 ml extrakčního pufru. Zkumavky lze vyzvednout v laboratoři OKB FNOL.

Postup odběru:

1. Vyndejte tvarovanou tyčinku otočením šroubovacího víčka (bílé) proti směru hodinových ručiček. Upozornění: neodstraňujte modrou plastovou část (obr. 1).
2. Ponořte tyčinku až na 4 různých místech do dříve odebraného vzorku stolice a opakovaně otáčejte tyčinkou, aby byl vzorek co nejvíce homogenní. Ujistěte se, že byly naplněny všechny drážky materiálem stolice (obr. 2).

Obr. 1



Obr. 2

3. Před vložením tyčinky do zkumavky odstraňte přebytek stolice otáčením tyčinky na vnitřní stěně kontejneru se stolicí.
4. Zcela ponořte tyčinku s materiálem stolice do zkumavky Vitassay obsahující extrakční roztok. Tyčinku zasuňte přes modrý separátor.
5. Při otáčení šroubovacího víčka (po směru hodinových ručiček) přidržte prsty modrý separátor, aby se zabránilo otevření a vzniku mezery.
6. Odebraný vzorek předejte do tří dnů lékaři. Do té doby uchovávejte vzorek v chladu (2 – 8 °C).