

PICC PERIFERNĚ ZAVEDENÝ CENTRÁLNÍ KATÉTR

EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY ◀.....

- **Krevní sraženina** (trombóza) v žíle, paže Vás může začít pobolívat, být citlivá a nateklá, promodrávat. Bolest i otok se může rozšířit až na krk.
- **Krvácení** 24h po zavedení je normální, později se může objevit po zvedání těžkých břemen.

Pokud nastanou komplikace, co mám dělat?

Pokud jste hospitalizován, informujte ošetřující sestru nebo lékaře. Pokud jste propuštěný do domácího ošetřování, navštivte v pracovní době PICC tým na ambulanci II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické (2IKaGER), mimo pracovní dobu na JIP 2IKaGER, a to v případě, že:

- Váš katétr nebo krytí se odlepilo, z místa vpichu vytéká tekutina.
- Necítíte se dobře.
- Máte třesavku, zimnici, horečku.
- Paže s PICC katétreem je nateklá, nebo bolestivá, začervenává, s puchýřky.

Pokud je Vaše dojezdová vzdálenost do FNOL velká, obraťte se na Urgentní příjem nebo pohotovostní službu nejbližší nemocnice.

Urgentní příjem nebo pohotovostní službu nejbližší nemocnice navštivte, i v případě, že:

- Došlo k nechtěnému ustřížení katétru, katétr zalomte, přilepte, a pokud se Vám začíná hůře dýchat, **volejte RZP (Rychlá zdravotnická pomoc).**

Jak se katétr vytahuje?

Pokud už PICC nebudete potřebovat, sestra či lékař vytáhne katétr v poloze vleže a přiloží na místo vpichu voděodolné krytí, které se ponechává 24h.

ZPRACOVALI:

Mgr. Martina Douglas
Mgr. Adéla Kolková
Bc. Monika Labudíková

ODBORNÝ KONZULTANT:

MUDr. Martin Troubil Ph.D.

INFORMAČNÍ ZDROJE:

www.guysandstthomas.nhs.uk/resources/patient-information/radiology/peripherally-inserted-central-catheter.pdf
[http://brochures.mater.org.au/brochures/mater-private-hospital-brisbane/vascular-access-device-\(picc-line-insertion\)](http://brochures.mater.org.au/brochures/mater-private-hospital-brisbane/vascular-access-device-(picc-line-insertion))

KONTAKT

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

e-mail: info@fnol.cz

www.fnol.cz

Pro další informace kontaktujte PICC tým FN Olomouc v pracovní době od 07:00-15:30 h.

Tel: +420 588 445 129, +420 588 445 305.

Pacienti HOK v pracovní době od 07:00-15:30 h.

Tel.:+420 588 444 893



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Tento informační leták byl vytvořen, aby Vám a Vaší rodině pomohl porozumět, co to PICC katétr je, jak se zavádí a jak o něj pečovat.


Tento katétr lze použít pro dlouhodobé podávání intravenózních (nitrožilních) léků jako jsou antibiotika, chemoterapie, parenterální výživa a krevní transfuze.

CO JE PICC KATÉTR?

PICC katétr je „periferně inzertovaný (zavedený) centrální žilní katétr“.

PICC je dlouhá, tenká a ohebná hadička (okolo 50cm), která se zavádí žilami na paži. Konec katétru dosahuje do centrální horní duté žíly.

PICC KATÉTR



PROČ POTŘEBUJETE PICC KATÉTR

- PICC katétr jsou používány, pokud potřebujete dostávat léky nitrožilně (např. antibiotika) na více než 14 dní.
- Hlavní výhodou PICC katétru je, že jej lze ponechat zavedené po celou dobu Vaší léčby bez nutnosti opakovaného zavádění jiných druhů kanyl.
- Je velmi výhodný u pacientů, kteří mají křehké a špatně viditelné žíly.

JAK SE PICC ZAVÁDÍ?

Lékař nebo sestra specialista Vám vysvětlí, jak zavedení katétru probíhá. Budete mít možnost prodiskutovat Vaše otázky. Pokud s výkonem souhlasíte, podepíšete informovaný souhlas. Zavedení PICC katétru není operace, ale je prováděno za sterilních podmínek. K výběru nejkvalitnější žíly na paži se používá ultrazvukový přístroj.

- Lékař i sestra budou oblečeni do sterilního pláště a mít na hlavě operační čepici a obličejovou masku.
- Paže bude natřena dezinfekčním roztokem a překryta sterilní rouškou. Poté se velkou rouškou zakryje celé tělo.
- Před výkonem Vám bude místo zavedení katétru místně znecitlivěno.
- Zavedení katétru trvá většinou 30-60 minut.
- Místo vpichu bude překryto voděodolnou fólií.
- Po zavedení katétru, pokud lékař neurčí jinak, se provede rentgenové vyšetření hrudníku k ověření polohy katétru.

PO ZAVEDENÍ PICC KATÉTRU

Někdy po zavedení katétru může být paže citlivá, okolí místa vpichu lehce zarudlé. Přiložení teplého obkladu na paži Vám může pomoci. Citlivost by měla vymizet do 2-7 dní.

NÁSLEDNÁ PÉČE O PICC KATÉTR

O katétr je nutné pečovat, abychom zabránili případným komplikacím. Krytí se vymění za 24h po zavedení a následně za 7 dní, neurčí-li lékař či sestra specialista jinak. Týdně Vám bude provedena:

- Výměna krytí na katétru (prevence infekce a vytažení)
- Proplach katétru sterilním fyziologickým roztokem (prevence zablokování katétru)

ČASTÉ DOTAZY PACIENTŮ

Mohu se s PICC katétre koupat/sprchovat?

Přestože je katétr překrytý částečně voděodolnou fólií, je třeba obalit paži s PICC katétre potravinářskou fólií, nebo omotat igelitovým sáčkem a připevnit gumičkami, pokud se budete koupat, tak paži s katétre nesmíte ponořit pod vodu. Krytí i lumeny katétru je třeba udržet v suchu (prevence infekce).

Co bych měl omezit?

Není třeba omezovat běžné denní aktivity a lehkou práci doma i na zahradě. Není doporučena těžká práce (sekání dřeva, práce s křovinořezem, skládání uhlí, mytí oken apod.) a nosit těžká břemena. Není doporučeno plavat z důvodu možné infekce a hrát golf či tenis. Pokud si nejste jistí, zeptejte se ošetřujícího lékaře či sestry.

Jaké komplikace se mohou vyskytnout?

Komplikace s PICC katétre bývají vzácné, přesto o nich musíte vědět, zahrnují:

- **Zánět žíly** (flebitida) okolí místa vpichu i nad ním může být citlivé, zarudlé a bolestivé.
- **Infekce** okolí místa vpichu zarudlé a bolestivé nebo se objeví hnisavá sekrece. Můžete mít horečku (nad 38°C).